

¿QUÉ HACER EN UN TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR?

- Acudir al dentista lo antes posible.



- En fractura parcial del diente intentar recuperar fragmento y acudir al dentista

EN CASO DE DESALOJO TOTAL DEL DIENTE

En dientes primarios (de leche): buscar diente en boca o suelo (asegúrese que no haya sido aspirado). No reimplantar.

En dientes permanentes:

- ✓ Buscar diente
- ✓ Tomar por la corona
- ✓ Si está sucio:

Lavar 2-3 segundos con agua corriente

- ✓ Intentar colocar en posición
- ✓ Si no puede

colocarlo en su posición colocar en **leche** o suero

- ✓ Acuda al dentista lo antes posible (60 minutos)



EL TIEMPO ES VITAL

Clínica Cuidados Especiales Facultad de Odontología Universidad de Chile

Dirección: Av. La Paz 750, 2º piso Norte
Fono: 56-229785019

Autores:

Dra. María Fernanda Troncoso
Krämer S., Sepúlveda L., Valle M., Gamboa F.

Principales referencias

IADT Treatment Guidelines – Dental Trauma Guide [Internet]. Dentaltraumaguide.org. 2017 [cited 10 November 2017]. Available from: <https://dentaltraumaguide.org/iadt-treatment-guidelines/>

Guía de Práctica Clínica: Abordaje y Manejo de la Parálisis Cerebral. [Internet]. Academia.utp.edu.co. 2017 [cited 10 November 2017]. Available from: <http://academia.utp.edu.co/programas-de-salud-3/files/2014/02/GU%C3%8DA-PAR%C3%81LISIS-CEREBRAL.-FINAL.pdf>

Año 2017

Sonríe Sano



Prevención y manejo de Trauma Dentoalveolar en personas con Parálisis Cerebral



PARÁLISIS CEREBRAL

La parálisis cerebral es un grupo de trastornos del desarrollo psicomotor que pueden causar alteraciones del movimiento, la postura y la actividad. Se atribuye a una lesión no progresiva que ocurre en un cerebro en desarrollo.

¿QUÉ ES EL TRAUMA DENTOALVEOLAR?

El trauma dentoalveolar corresponde a una lesión traumática que afecta al diente propiamente tal, y a las estructuras de soporte que lo rodean, consecutiva a un impacto violento.

CONSECUENCIAS

- × Infección e inflamación
- × Defectos estéticos
- × Problemas funcionales
- × Problemas en dientes definitivos



RIESGO EN PARÁLISIS CEREBRAL

Las personas con parálisis cerebral tienen mayor riesgo de sufrir un traumatismo dentoalveolar por caídas accidentales o alteraciones en el control neuromuscular.

RIESGO

¿CÓMO PREVENIRLO?

PREVENCIÓN ESPECÍFICA DE TRAUMA DENTOALVEOLAR

DISMINUIR RIESGO DE CAÍDAS

- Suelo liso, sin obstáculos.
- Baño: pasamanos, WC alto.



- Camas bajas
- Agrupar muebles en un sector
- Paredes de colores contrastantes

- Mantener orden
- Uso de cinturón en silla de ruedas




- Terapias de equilibrio y postura
- Terapias de refuerzo de tono muscular

- Evitar traslados con objetos o alimentos en boca




- Protectores bucales realizados por dentistas

- Terapias de integración sensorial



- Terapias Miofuncionales

- Tratamientos de ortodoncia para cambiar eje de dientes anteriores



- Acudir a controles periódicos con su dentista